

NOTE

SUR

QUELQUES CORÉIDES DU CONGO

PAR

le Dr H. SCHOUTEDEN

(Musée du Congo belge, Tervueren).

1. — *Dilycoctha Brouni* n. spec.

Forme générale du *D. tenuicornis* KARSCH; les angles latéraux du pronotum sont cependant un peu moins proéminents que ce n'est le cas en général chez celui-ci.

La coloration diffère chez les deux types ♂♀.

♂. Dessous flavescent, y compris les pattes; de même la tête, les côtés antérolatéraux du pronotum, le connexivum. La tête a en dessus la partie basale noirâtre jusqu'aux ocelles, avec sinus entre ceux-ci. Pronotum d'un noir bronzé brillant, tout le disque (sauf la ligne médiane) d'un vert métallique. Écusson également noir plus ou moins bronzé. Élytres de même, avec les nervures à la base, une tache transversale interne au niveau de la pointe de l'écusson, et une autre plus large, arquée en arrière, traversant la corie de part en part après l'extrémité du clavus, d'un flavescent-ivoire, de même que le bord apical du clavus; membrane d'un bleu-violet foncé, mêlé de vert entre les nervures, assez brillante. Fémurs postérieurs noirs apicalement ainsi qu'à l'extrémité des épines; les autres fémurs à peine rembrunis

au sommet; tibias postérieurs également noirs (l'apex à peine plus clair). Antennes noires. Rostre noir à son extrême bout seulement.

Pronotum paraissant un peu plus déprimé que chez *D. tenuicornis*, les angles latéraux sans denticule; sa surface assez densément ponctuée-chagrinée. Épines des fémurs postérieurs nettes dès le tiers basal de ceux-ci (la moitié chez *D. tenuicornis*); ces fémurs plus brillants que chez le type du genre.

♀. Dessous rouge-cinabre, passant au flavescent sur les tibias et les tarse; de même la tête, le connexivum, les côtés antérolatéraux du pronotum. La tête noirâtre à la base comme chez le ♂. Pronotum bronzé verdâtre, avec une ligne longitudinale médiane flavescente allant de la base aux cicatrices. Élytres à nervures flavescentes sur le tiers basal, puis après la moitié, l'extrémité exceptée; une macule de même couleur vers l'apex de l'écusson et une autre après la moitié, externe; pour le reste, l'élytre est, comme l'écusson, d'un brun-chocolat mais passant déjà au noir dans la région externe et basale; membrane d'un noir légèrement bronzé, les nervures bronzées et brillantes. Fémurs postérieurs noirs distalement; les tibias postérieurs noirâtres à la base. Sixième segment du connexivum à base plus pâle.

Long. 19.5 (♂). — 23 (♀) mm.

Récoltés à Bikoro, en décembre 1912, par M. BROWN, à qui je dédie cette nouvelle espèce.

Le *D. Brouni* est très voisin du *D. tenuicornis* mais sa coloration est fort différente, notamment celle du pronotum : chez *D. tenuicornis* ni chez l'adulte parfait ni chez l'insecte immature encore on n'observe de coloration métallique.

2. — *Zenkeria tarsalis* SCHOUT.

De cette intéressante espèce, que j'ai décrite d'après un exemplaire ♀ de ma collection, provenant du Congo français, mon collègue du Musée du Congo, M. le Dr J. MAES, a recueilli un spécimen ♂, à Oshwe.

Cet exemplaire est mature et la coloration foncière en est noire, la pubescence (formant des mouchetures et marbrures) dorée. Le 4^e article des antennes est flavescent à la base. Les tarse intermédiaires n'ont que le 2^e article flave, avec le dessous noirâtre; les tarse postérieurs ont de même le 2^e article flave, mais en outre le 2^e est flave distalement en dessus. Fémurs postérieurs offrant, outre

les épines indiquées pour la ♀, une paire d'épines plus petites supplémentaire, proximale; la forme de ces fémurs et des tibias correspondants est semblable à celle qu'ils ont chez la ♀, mais les fémurs sont plus robustes et la denticulation des tibias est assez forte.

3. — **Murtula beniensis** SCHOUT.

Dans la description du genre *Murtula* il y a lieu d'ajouter ce caractère important que le pli du 6^e segment ventral de la femelle est tronqué, et non pas angulé comme c'est le cas chez les autres *Petascelaria* africains.

Le Dr J. MAES a récolté le *Murtula beniensis* à Oshwe, dans le district du Lac Léopold II. Cette provenance est fort intéressante, les types ayant été recueillis dans l'Ituri.

4. — **Daladeropsis Hutereauae** n. spec.

Très voisin du *D. africana* DALL., que nous possédons de diverses localités congolaises, mais plus petit. S'en distingue à première vue par la forme du pronotum, dont les angles latéraux ne sont pas lobés vers l'avant comme chez *D. africana*: leur bord antérieur est simple et faiblement arqué. Les côtés de l'abdomen (♂) sont également moins dilatés, formant un angle plus obtus, et les antennes sont plus courtes. Les ocelles sont légèrement plus rapprochés des yeux.

La coloration générale est la même, mais la tête en dessus, les côtés du pronotum, les antennes (sauf le 4^e article), les pattes (sauf les tarsi), la région sternale et la marge de l'abdomen en dessus sont noirs ou noirâtres.

Long. (♂) 35.5 mm.

Un seul exemplaire, ♂, récolté à Adranga par M^{me} HUTEREAU, à qui je dédie ce type nouveau.
